

Behandelen of afwachten?

Heeft u eierstokcysten en bent u nog niet in de overgang? Deze keuzekaart kan u en uw arts helpen om mogelijkheden voor behandeling te bespreken. Let op! Heeft u klachten? Het is niet zeker of cystes op de eierstok deze klachten veroorzaken. Het is dus niet zeker of de klachten verdwijnen als de arts de cyste(s) of eierstok(ken) verwijdert.

Behandel mogelijkheden →	Afwachten	Cyste(s) verwijderen	1 eierstok volledig verwijderen	Beide eierstokken volledig verwijderen
Wat houdt de behandeling in?	<ul style="list-style-type: none"> De gynaecoloog opereert u niet en verwijdert de cyste niet. Afhankelijk van uw klachten en hoe groot de cyste is, bepaalt u samen met de gynaecoloog wanneer u moet terugkomen voor controle. In sommige gevallen is het niet nodig om terug te komen voor controle. 	<ul style="list-style-type: none"> De gynaecoloog verwijdert de cyste uit de eierstok. <p>De gynaecoloog kan u op 2 manieren opereren, hiervoor gaat u altijd onder narcose:</p> <ol style="list-style-type: none"> Met een kijkoperatie via de buik: <ul style="list-style-type: none"> Hiervoor wordt er eerst lucht in de buik geblazen. U kunt meestal dezelfde dag nog naar huis. U herstelt meestal binnen 2 weken. Via een snee in de buik: <ul style="list-style-type: none"> U moet 1, 2 of 3 nachten in het ziekenhuis blijven. U herstelt meestal binnen 4-6 weken. 	<ul style="list-style-type: none"> De gynaecoloog haalt de eierstok weg. 	<ul style="list-style-type: none"> De gynaecoloog haalt beide eierstokken weg.
Wat is het gevolg van afwachten of behandelen?	<ul style="list-style-type: none"> In de meeste gevallen blijven de klachten hetzelfde. Komen de klachten terug of worden ze erger? Ga dan terug naar de gynaecoloog en bespreek samen of u toch geopereerd wilt worden. 	<ul style="list-style-type: none"> De verwijderde cyste wordt onderzocht. Was de cyste goedaardig? Dan hoeft u alleen terug te komen voor nacontrole. Er bestaat een klein risico dat cystes terugkomen. 	<ul style="list-style-type: none"> De verwijderde eierstok met de cyste wordt onderzocht. Was de cyste goedaardig? Dan hoeft u alleen terug te komen voor nacontrole. Er bestaat een klein risico dat in de achtergebleven eierstok een cyste terugkomt. 	<ul style="list-style-type: none"> De verwijderde eierstokken met cyste worden onderzocht. Was de cyste goedaardig? Dan hoeft u alleen terug te komen voor nacontrole. Beide eierstokken zijn verwijderd, dus cystes kunnen niet meer terugkomen.
Wat zijn de risico's van afwachten of behandelen?	<ul style="list-style-type: none"> Er bestaat een heel klein risico op steeldraai of openspringen van de cyste. De gynaecoloog moet u dan misschien met spoed opereren. Blijft de cyste groeien? Of ziet de cyste er na een tijdje anders uit? Dan kan de gynaecoloog de cyste later alsnog verwijderen. 	<ul style="list-style-type: none"> De operatie geeft een klein risico op complicaties, bijvoorbeeld een nabloeding, of beschadiging van de blaas, urineleider of darm. Verwijdert de gynaecoloog alleen een cyste? Dan bestaat er een risico dat deze openspringt tijdens de operatie. Verwijdert de gynaecoloog één of beide eierstokken? Dan is het risico kleiner dat er een cyste openspringt. Springt de cyste tijdens de operatie open? Dan komt de inhoud daarvan in de buik. Bij de meeste cystes kan dat geen kwaad. 		
Hoe zeker is het dat de cyste goedaardig of kwaadaardig is?	<ul style="list-style-type: none"> De gynaecoloog kan op basis van een echo meestal goed inschatten of de cyste goed- of kwaadaardig is. Afwachten kan alleen als de cyste goedaardig lijkt. Bij controleafspraken krijgt u een echo om veranderingen in de cyste te volgen. 	<ul style="list-style-type: none"> Na onderzoek van de cyste weten we zeker of de cyste goedaardig of kwaadaardig was. Was de verwijderde cyste kwaadaardig? Dan maakt de gynaecoloog samen met u een vervolgplan. 		
Wat voor gevolgen heeft afwachten of behandelen voor mijn hormoon-huishouding?	<ul style="list-style-type: none"> Er verandert niets in de hormoonhuishouding. Uw menstruatie verandert niet en u komt ook niet eerder in de overgang. De behandeling heeft geen invloed op de mogelijkheid om zwanger te worden. 	<ul style="list-style-type: none"> Er verandert niets in de hormoonhuishouding. Uw menstruatie verandert niet en u komt niet eerder in de overgang. De behandeling heeft geen invloed op de mogelijkheid om zwanger te worden. 	<ul style="list-style-type: none"> De overgebleven eierstok produceert genoeg hormonen om de hormoonspiegel op peil te houden. Uw menstruatie verandert niet en u komt niet veel eerder in de overgang. De behandeling heeft geen invloed op de mogelijkheid om zwanger te worden. 	<ul style="list-style-type: none"> Uw lichaam maakt geen hormonen meer aan. U komt daardoor direct in de overgang en u zult niet meer menstrueren. U kunt niet meer zwanger worden. Afhankelijk van uw leeftijd en klachten kan de gynaecoloog u hormonen voorschrijven. U kunt minder zin in seks hebben.