

KEUZKAART Constitutioneel (atopisch) eczeem

Mogelijkheden voor systemische medicijnen bij volwassenen

Heeft u constitutioneel eczeem? Deze keuzekaart kan u en uw arts helpen om een keuze te maken uit de mogelijke systemische medicijnen. Een systemisch medicijn is een medicijn dat in het hele lichaam terechtkomt. Alle medicijnen remmen de ontstekingsreactie en/of onderdrukken de afweer, zodat uw eczeem minder wordt. Deze medicijnen kunnen mogelijk het risico op infecties en kanker vergroten. U mag tijdens de behandeling met zo'n medicijn niet ingeënt worden met een levend vaccin. Twijfelt u tussen een behandeling met een zalf of crème, een lichtbehandeling en een systemische behandeling? Gebruik dan de keuzekaart "Constitutioneel eczeem: mogelijkheden voor behandeling bij volwassenen".

Behandel mogelijkheden →	Ciclosporine	Azathioprine (off-label)	Methotrexaat (off-label)	Mycofenolaat, mycofenolzuur (off-label)	Prednison (off-label)
Hoe gebruikt u dit medicijn?	<ul style="list-style-type: none"> U slikt uw pillen 2 keer per dag voor, tijdens of na de maaltijd. U kunt dit medicijn 1 tot 2 jaar gebruiken. Langer kan soms ook. 	<ul style="list-style-type: none"> U slikt uw pillen 2 keer per dag. Dat doet u 1 uur voor de maaltijd of 3 uur erna. U kunt dit medicijn 1 jaar gebruiken, sommige mensen gebruiken dit medicijn meerdere jaren. 	<ul style="list-style-type: none"> Eén keer per week slikt u uw pillen of geeft u uzelf een injectie. Dat doet u 1 uur voor de maaltijd of 1,5 tot 2 uur erna. U kunt dit medicijn langer dan 5 jaar gebruiken. 	<ul style="list-style-type: none"> U slikt uw pillen 2 keer per dag, voor, tijdens of na de maaltijd. Sommige mensen gebruiken dit medicijn meerdere jaren. 	<ul style="list-style-type: none"> U slikt uw pillen 1 keer per dag voor of tijdens de maaltijd. Het wordt afgeraden dit medicijn voor langere tijd te gebruiken. In ernstige acute gevallen kunt u Prednison 2 tot 3 weken slikken.
Wat is het effect op de klachten? En hoe snel verminderen de klachten?	<ul style="list-style-type: none"> Goed effect op de klachten. Goed effect op de jeuk. Klachten verminderen binnen 2 tot 6 weken. 	<ul style="list-style-type: none"> Redelijk effect op de klachten. Redelijk effect op de jeuk. Klachten verminderen binnen enkele weken tot enkele maanden. 	<ul style="list-style-type: none"> Redelijk effect op de klachten. Redelijk effect op de jeuk. Klachten verminderen binnen enkele weken tot 10 weken. 	<ul style="list-style-type: none"> Redelijk effect op de klachten. Waarschijnlijk een redelijk effect op de jeuk. Klachten verminderen binnen enkele weken tot enkele maanden. 	<ul style="list-style-type: none"> Zeer goed effect op de klachten. Zeer goed effect op de jeuk. Klachten verminderen binnen 1 dag tot enkele dagen.
Welke bijwerkingen komen heel vaak voor? Dus bij 10 van de 100 patiënten of meer (≥10%).	<ul style="list-style-type: none"> Verhoogd bloedvetgehalte (onder andere cholesterol) Trillingen Hoofdpijn Hoge bloeddruk Overbeharing Verstoorde nierfunctie 	Tekort aan witte bloedcellen door een verstoorde beenmergfunctie.	<ul style="list-style-type: none"> Minder eetlust Misselijkheid, braken en buikpijn Slijmvliezen van mond en keel kunnen gaan ontsteken en zweren Maagklachten en slokdarmklachten Verstoorde leverfunctie 	<ul style="list-style-type: none"> Bloedvergiftiging Tekort aan witte bloedcellen Tekort aan bloedplaatjes Bloedarmoede Misselijkheid, braken, buikpijn en diarree 	Er zijn veel 'vaak voorkomende' bijwerkingen (bij 1 tot 10 van de 100 patiënten (1-10%) zoals een verstoorde bloedsuikerspiegel, stemmingswisselingen en vasthouden van vocht.
Welke aandoeningen kunnen erger worden als u dit medicijn gebruikt?	<ul style="list-style-type: none"> Verstoorde nierfunctie Aandoeningen aan de lever Hoge bloeddruk Jicht 	<ul style="list-style-type: none"> Verstoorde leverfunctie Verstoorde beenmergfunctie Ontsteking aan de alvleesklier Jicht 	<ul style="list-style-type: none"> Aandoeningen aan de lever of nieren Verstoorde beenmergfunctie Slechte longfunctie of fibrose (littekens) in de longen Afweerstoorissen Maagzweer Jicht 	<ul style="list-style-type: none"> Jicht 	<ul style="list-style-type: none"> Zweer in de maag of twaalfvingerige darm Suikerziekte Hoge bloeddruk Broze botten Psychische stoornissen
Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?	<ul style="list-style-type: none"> Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Dan mag u dit medicijn eventueel gebruiken onder strikte controle van een arts. Gebruik dit medicijn niet als u borstvoeding geeft. 	Bent u zwanger, wilt u zwanger worden of heeft u een vaderwens? Of geeft u borstvoeding? Dan mag u dit medicijn niet gebruiken.	<ul style="list-style-type: none"> Bent u zwanger, wilt u zwanger worden of heeft u een vaderwens? Of geeft u borstvoeding? Dan mag u dit medicijn niet gebruiken. U moet uw alcoholgebruik beperken tot een minimum. 	Bent u zwanger, wilt u zwanger worden of heeft u een vaderwens? Of geeft u borstvoeding? Dan mag u dit medicijn niet gebruiken.	<ul style="list-style-type: none"> Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Dan mag u dit medicijn eventueel gebruiken onder strikte controle van een arts. Gebruik dit medicijn niet als u borstvoeding geeft.